

# À propos de

# Pr MAVENCLAD<sup>MD</sup>

adveva<sup>MD</sup>  
SOUTIEN PERSONNALISÉ POUR VOUS ACCOMPAGNER

## À propos de ce livret

Le programme de soutien adveva<sup>MD</sup> a conçu le présent livret pour vous présenter MAVENCLAD et le plan de traitement que vous êtes sur le point de commencer. Veuillez le lire attentivement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à l'équipe d'adveva.

## Autres livrets faisant partie de cette série

- Avant de prendre MAVENCLAD
- Conserver et prendre MAVENCLAD
- Effets secondaires et risques potentiels de MAVENCLAD
- Contraception, grossesse et MAVENCLAD
- Après votre première année de traitement

**Choisissez parmi trois façons pratiques de communiquer avec nous : par téléphone, par courriel ou par clavardage en direct.**



1-877-777-3243

Accessible en tout temps



adveva\_canada@emdserono.com



www.adveva.ca

Selon la disponibilité  
du personnel infirmier


 Pr MAVENCLAD<sup>MD</sup>  
comprimés de cladribine

# À propos de MAVENCLAD

MAVENCLAD est utilisé pour traiter les adultes atteints de sclérose en plaques (SP) rémittente. Il a été démontré qu'un traitement par MAVENCLAD diminue la fréquence des poussées et ralentit la progression de l'invalidité. MAVENCLAD est généralement recommandé pour les patients atteints de SP qui n'ont pas bien répondu à un ou plusieurs autres traitements contre la SP ou ne les ont pas tolérés.

MAVENCLAD doit être pris pendant deux semaines la première année et pendant deux semaines la deuxième année. Les deux semaines de traitement sont espacées d'un mois. Une semaine de traitement consiste en la prise de un ou deux comprimés par jour sur une période de quatre à cinq jours.


Le traitement sur deux ans ressemblera donc à ceci :



Votre professionnel de la santé surveillera votre état aux années 3 et 4, au cours desquelles vous n'aurez pas besoin de prendre MAVENCLAD.

# À quoi vous attendre durant vos rendez-vous

Le tableau ci-dessous vous aide à visualiser à quel moment votre professionnel de la santé voudra vous voir et ce qui se passera durant ces rendez-vous.



-  Votre professionnel de la santé vous fera passer une analyse sanguine pour s'assurer que les taux de lymphocytes se situent dans l'intervalle des valeurs acceptables.
-  Avant de commencer le traitement, certaines enzymes hépatiques et le taux de bilirubine totale seront mesurés. Ces analyses sont particulièrement importantes si vous êtes sensible aux lésions hépatiques.
-  Vous subirez des tests pour vérifier si vous avez une infection quelconque avant de commencer le traitement.
-  Si nécessaire, vous serez vacciné contre la varicelle avant le début du traitement par MAVENCLAD.
-  Si vous êtes une femme, vous subirez un test de grossesse pour vérifier que vous n'êtes pas enceinte avant de commencer à prendre MAVENCLAD.
-  Par précaution, vous devrez peut-être subir un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM) du cerveau avant le début du traitement. Cet examen est particulièrement important si vous avez déjà pris d'autres médicaments contre la SP.

# Comment MAVENCLAD agit-il?

Pour comprendre comment MAVENCLAD agit, voici un rappel de ce qui se produit dans l'organisme des personnes atteintes de SP. La SP est une maladie complexe, et différents types de cellules immunitaires, y compris les cellules T et B autoréactives, jouent un rôle clé. Chez les personnes atteintes de SP, le système immunitaire attaque l'enveloppe protectrice des nerfs (appelée *myéline*), ce qui entraîne une inflammation et des lésions pouvant provoquer les symptômes de la maladie.

## Que fait MAVENCLAD?

MAVENCLAD agit de façon spécifique sur des cellules de votre système immunitaire appelées *lymphocytes B* et *lymphocytes T* (types de globules blancs) afin de réduire l'inflammation présente dans votre organisme à cause de la SP.

## Le rôle du traitement

La SP est une maladie chronique qu'il est actuellement possible de prendre en charge, mais pour laquelle il n'existe aucun traitement curatif. Un traitement approprié peut être prescrit pour réduire la fréquence des exacerbations cliniques et retarder la progression de l'invalidité. Assurez-vous de prendre votre médicament exactement de la façon dont il vous a été prescrit.

# Renseignements importants au sujet de MAVENCLAD

**Ne prenez pas MAVENCLAD** si vous êtes allergique (hypersensible) à la cladribine ou à tout autre ingrédient que contient MAVENCLAD; vous présentez un risque d'infection parce que votre système immunitaire est affaibli par des traitements que vous recevez (traitements contre le cancer, corticostéroïdes pris de façon prolongée, greffe[s] de moelle osseuse, etc.) ou par d'autres affections médicales (par exemple, si vous êtes infecté par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]); vous avez une infection active ou inactive (passée), par exemple, la tuberculose ou une inflammation du foie (hépatite); vous avez ou avez eu une infection rare du cerveau appelée la leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP); vous avez un cancer actif; vous avez des problèmes de rein modérés ou graves; vous êtes enceinte ou vous allaitez; vous êtes une femme ou un homme apte à procréer et vous n'utilisez pas de méthode de contraception.

## Avant d'utiliser MAVENCLAD

Consultez votre professionnel de la santé si votre système immunitaire est affaibli par des traitements que vous recevez ou par d'autres affections médicales; vous avez une infection; vous avez des problèmes de foie; vous avez récemment reçu un vaccin; vous avez ou avez déjà eu un cancer; vous avez besoin de transfusions sanguines; vous êtes enceinte ou envisagez de devenir enceinte, car MAVENCLAD peut nuire à votre bébé; vous allaitez ou vous prévoyez d'allaiter (on ne sait pas si MAVENCLAD passe dans le lait maternel; vous ne devez pas allaiter les jours où vous prenez MAVENCLAD et pendant 10 jours suivant la prise de votre dernière dose); vous avez moins de 18 ans.

## Effets secondaires

MAVENCLAD peut causer des effets secondaires. La liste des effets secondaires possibles qui suit n'énumère pas tous ceux qui peuvent survenir. Les effets secondaires les plus fréquents sont les nausées et les maux de tête. Les autres effets secondaires fréquents comprennent les suivants : feux sauvages (herpès labial), éruption cutanée (« rash »), amincissement des cheveux ou perte de cheveux, fièvre, douleur abdominale, mal de dent, grippe et symptômes faisant penser à ceux de la grippe, symptôme de rhume, bronchite ou autres infections pulmonaires, symptômes de gastroentérite (diarrhée, vomissements, douleur abdominale), mal de dos, anxiété et infection vaginale.

Consultez votre professionnel de la santé si l'un ou l'autre des effets secondaires graves suivants se manifeste : lymphopénie, qui est une réduction du nombre de certains globules blancs du sang, dont les symptômes sont des infections, une sensation de fatigue inhabituelle, de la fièvre, des courbatures, de la douleur et des symptômes faisant penser à ceux de la grippe; zona, dont les symptômes sont une douleur aiguë et une éruption cutanée avec des cloques sur une « bande » localisée, habituellement sur un seul côté du haut du corps ou du visage, des maux de tête, une sensation de brûlure, des picotements, un engourdissement ou une démangeaison de la peau dans la zone touchée ou une sensation de malaise généralisé ou de la fièvre dans les premiers stades de l'infection; problèmes de foie, dont les symptômes sont des nausées, des vomissements, des douleurs d'estomac, une perte d'appétit, de la fatigue, des urines foncées ou un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux; tuberculose, dont les symptômes sont une toux qui persiste, de la fièvre ou une perte de poids. Cessez de prendre MAVENCLAD et consultez immédiatement un médecin si vous avez une réaction allergique (hypersensibilité); les symptômes comprennent une éruption cutanée, de l'urticaire, des démangeaisons, de l'enflure, un essoufflement, de la fièvre, une respiration sifflante, un écoulement nasal, des démangeaisons aux yeux et un larmolement. Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommode qui n'est pas mentionné ici ou qui s'aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, consultez votre professionnel de la santé.

## Autres mises en garde à connaître

### Analyses sanguines

On vous fera passer des analyses sanguines avant que vous ne commenciez le traitement par MAVENCLAD, ainsi que pendant et après le traitement, afin de s'assurer que vous pouvez continuer à prendre MAVENCLAD et que vous ne développez aucune complication à cause du traitement.

## Infections en général

Vous subirez des tests pour vérifier si vous avez une infection quelconque avant de commencer le traitement. Il est important que vous discutiez avec votre professionnel de la santé si vous pensez avoir une infection avant, pendant ou après le traitement. Les symptômes d'infection peuvent comprendre la fièvre, des courbatures et des douleurs musculaires, des maux de tête, une sensation de malaise généralisé ou une perte d'appétit. Votre professionnel de la santé peut retarder le début du traitement ou interrompre le traitement en cours jusqu'à ce que l'infection disparaisse.

## Vaccination

Parlez à votre professionnel de la santé si vous avez récemment reçu ou si vous pourriez recevoir certains vaccins appelés vaccins « vivants » ou « vivants atténués ». Le traitement peut seulement commencer 6 semaines après la vaccination. Si nécessaire, vous serez vacciné contre la varicelle avant le début du traitement. Vous ne devez pas recevoir de vaccin pendant le traitement. Vous pouvez seulement vous faire vacciner après le traitement une fois que le nombre de vos globules blancs est normal.

## Leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP)

La LEMP est un trouble rare du cerveau provoqué par une infection; il s'agit d'une affection grave pouvant entraîner une invalidité grave ou même la mort. Par précaution, il se peut qu'on vous fasse passer un examen d'IRM (imagerie par résonance magnétique) de la tête avant le début du traitement. Cela est particulièrement important si vous avez déjà pris d'autres médicaments contre la sclérose en plaques associés à un risque de LEMP. Parlez à votre professionnel de la santé si vous pensez que votre SP s'aggrave ou si vous constatez de nouveaux symptômes comme les suivants : faiblesse sur un côté du corps qui s'aggrave, maladresse avec vos bras ou vos jambes, trouble de la vision, changements affectant votre capacité de penser et votre mémoire qui entraînent une confusion et des changements dans votre personnalité.

## Risque de cancer

MAVENCLAD pourrait potentiellement augmenter le risque de cancer. Suivez les instructions données par votre professionnel de la santé concernant le dépistage du cancer.

## Intolérance au fructose

MAVENCLAD contient du sorbitol. Ne prenez pas MAVENCLAD si vous avez des problèmes héréditaires d'intolérance au fructose.

## Grossesse et fertilité

Les femmes et les hommes doivent utiliser une méthode de contraception efficace durant le traitement et pendant au moins 6 mois après la dernière dose. Chez les femmes qui prennent MAVENCLAD, on ne sait pas si le médicament réduira l'efficacité de la pilule contraceptive. Par conséquent, il faut utiliser une méthode de contraception barrière (par exemple, des condoms) en plus de la pilule pendant le traitement et pendant au moins 4 semaines après la prise de la dernière dose pour chaque année de traitement. Si vous ou votre partenaire devenez enceinte pendant le traitement ou dans les 6 mois qui suivent la prise de la dernière dose, il peut y avoir un risque pour l'enfant à naître. Votre professionnel de la santé arrêtera le traitement par MAVENCLAD si vous êtes une femme et que vous devenez enceinte pendant le traitement. MAVENCLAD peut porter atteinte à la fertilité chez les hommes. Parlez à votre professionnel de la santé pour obtenir de plus amples renseignements. Comme on ne sait pas si MAVENCLAD est détectable dans le sperme, il convient d'utiliser une méthode de contraception barrière comme le condom pendant le traitement et dans les 10 jours qui suivent la prise de la dernière dose.

**Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la notice d'accompagnement du médicament.**

© 2022 EMD Serono. Tous droits réservés.  
MAVENCLAD et adveva sont des marques déposées de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, ou de ses filiales.

Importateur et distributeur :  
EMD Serono, une division d'EMD Inc., Canada  
Une filiale de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne  
2695 North Sheridan Way, bureau 200  
Mississauga (Ontario) L5K 2N6 Canada  
[www.emdserono.ca](http://www.emdserono.ca)

adveva : 1-877-777-3243

