

Avant de prendre

Pr **MAVENCLAD**^{MD}

adveva^{MD}
SOUTIEN PERSONNALISÉ POUR VOUS ACCOMPAGNER

À propos de ce livret

Le programme de soutien adveva^{MD} a conçu le présent livret pour les personnes qui commencent un traitement par MAVENCLAD. Ce livret traite de différents sujets que vous aurez déjà abordés avec votre professionnel de la santé et il explique les différentes analyses médicales nécessaires avant de commencer le traitement par MAVENCLAD.

Autres livrets faisant partie de cette série

- À propos de MAVENCLAD
- Conserver et prendre MAVENCLAD
- Effets secondaires et risques potentiels de MAVENCLAD
- Contraception, grossesse et MAVENCLAD
- Après votre première année de traitement

Choisissez parmi trois façons pratiques de communiquer avec nous : par téléphone, par courriel ou par clavardage en direct.



1-877-777-3243

Accessible en tout temps



adveva_canada@emdserono.com



www.adveva.ca


*Selon la disponibilité
du personnel infirmier*

 Pr **MAVENCLAD**^{MD}
comprimés de cladribine

Avant le traitement par MAVENCLAD

Avant de commencer le traitement par MAVENCLAD, votre professionnel de la santé effectuera une série de tests et vous posera des questions importantes afin de vous préparer au traitement. Certains des tests que votre professionnel de la santé pourrait effectuer sont énumérés ci-dessous.

Bilan sanguin



Numération des lymphocytes

MAVENCLAD est lié à une réduction des cellules de votre système immunitaire appelées lymphocytes (un type de globules blancs). Cela signifie que votre professionnel de la santé effectuera une analyse sanguine afin de vérifier si vos lymphocytes se situent dans un intervalle de valeurs acceptable :


- Avant de commencer MAVENCLAD la première année
- Avant de commencer MAVENCLAD la deuxième année
- Périodiquement entre les cycles de traitement et par la suite

Si la numération des lymphocytes est inférieure à un seuil accepté, votre traitement sera retardé.



Taux d'enzymes hépatiques et de bilirubine totale

Avant de commencer chaque cycle de traitement, vous subirez des tests pour vérifier les taux de certaines enzymes hépatiques et de bilirubine totale. En cas de taux anormaux, votre professionnel de la santé peut retarder votre traitement. Il faut conseiller aux patients de signaler immédiatement tout signe ou symptôme de problèmes de foie, tels que nausées, vomissements, douleurs à l'estomac, perte d'appétit, fatigue, urines foncées ou jaunissement de la peau ou du blanc des yeux.



Infections en général

Vous subirez des tests pour vérifier si vous avez une infection quelconque avant de commencer le traitement par MAVENCLAD. Il est important que vous discutiez avec votre professionnel de la santé si vous pensez avoir une infection avant, pendant ou après le traitement. Si vous avez une infection, votre professionnel de la santé peut retarder le début du traitement ou interrompre le traitement en cours jusqu'à ce que l'infection disparaisse. Les symptômes d'infection peuvent comprendre les suivants : fièvre; courbatures, douleurs musculaires; maux de tête; sensation de malaise généralisé; perte d'appétit.



Zona

Votre professionnel de la santé surveillera l'apparition de signes ou de symptômes évocateurs du zona. Au besoin, vous serez vacciné contre le virus de la varicelle et du zona avant de commencer le traitement par MAVENCLAD. Si vous avez reçu un vaccin, vous devez attendre 6 semaines avant de commencer le traitement par MAVENCLAD.

Ce que doit savoir votre professionnel de la santé

Consultez votre professionnel de la santé si l'une des situations suivantes s'applique à vous :

- Votre système immunitaire est affaibli en raison de traitements que vous recevez (traitements contre le cancer [médicaments ou radiothérapie], greffe[s] de moelle osseuse, etc.).
- Votre système immunitaire est affaibli en raison d'une affection médicale que vous avez (par exemple, si vous êtes infecté par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]).
- Vous avez une infection.
- Vous avez des problèmes de foie.
- Vous avez récemment reçu un vaccin.
- Vous avez ou avez déjà eu un cancer.
- Vous avez besoin de transfusions sanguines.
- Vous êtes enceinte ou envisagez de devenir enceinte, car MAVENCLAD peut nuire à votre bébé.
- Vous allaitez ou prévoyez allaiter. On ne sait pas si MAVENCLAD passe dans le lait maternel. Vous ne devez pas allaiter les jours où vous prenez MAVENCLAD et pendant 10 jours suivant la prise de votre dernière dose.
- Vous avez moins de 18 ans.

La prise d'autres médicaments pendant le traitement par MAVENCLAD

Certains médicaments peuvent avoir un effet sur l'action de MAVENCLAD dans votre corps. Si ce n'est déjà fait, vous devez indiquer à votre professionnel de la santé les autres médicaments, les suppléments ou les thérapies complémentaires que vous prenez actuellement.



Vous ne devez pas prendre MAVENCLAD avec d'autres médicaments qui affaiblissent votre système immunitaire ou votre moelle osseuse.



Vous pouvez prendre un corticostéroïde sur une courte période lorsque votre professionnel de la santé vous le prescrit.

N'oubliez pas, en cas de doute, consultez votre professionnel de la santé. Ne cessez jamais de prendre un médicament à moins que votre professionnel de la santé vous dise de le faire.

Quand faut-il prendre MAVENCLAD et d'autres médicaments?

Vous ne devez prendre aucun autre médicament ou supplément par voie orale (par la bouche) en même temps que MAVENCLAD. Celui-ci pourrait interagir avec d'autres médicaments dans votre estomac.

Vous devez prendre les autres médicaments 3 heures avant ou 3 heures après avoir pris MAVENCLAD.

Renseignements importants au sujet de MAVENCLAD

Ne prenez pas MAVENCLAD si vous êtes allergique (hypersensible) à la cladribine ou à tout autre ingrédient que contient MAVENCLAD; vous présentez un risque d'infection parce que votre système immunitaire est affaibli par des traitements que vous recevez (traitements contre le cancer, corticostéroïdes pris de façon prolongée, greffe[s] de moelle osseuse, etc.) ou par d'autres affections médicales (par exemple, si vous êtes infecté par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]); vous avez une infection active ou inactive (passée), par exemple, la tuberculose ou une inflammation du foie (hépatite); vous avez ou avez eu une infection rare du cerveau appelée la leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP); vous avez un cancer actif; vous avez des problèmes de rein modérés ou graves; vous êtes enceinte ou vous allaitez; vous êtes une femme ou un homme apte à procréer et vous n'utilisez pas de méthode de contraception.

Effets secondaires

MAVENCLAD peut causer des effets secondaires. La liste des effets secondaires possibles qui suit n'énumère pas tous ceux qui peuvent survenir. Les effets secondaires les plus fréquents sont les nausées et les maux de tête. Les autres effets secondaires fréquents comprennent les suivants : feux sauvages (herpès labial), éruption cutanée (« rash »), amincissement des cheveux ou perte de cheveux, fièvre, douleur abdominale, mal de dent, grippe et symptômes faisant penser à ceux de la grippe, symptôme de rhume, bronchite ou autres infections pulmonaires, symptômes de gastroentérite (diarrhée, vomissements, douleur abdominale), mal de dos, anxiété et infection vaginale.

Consultez votre professionnel de la santé si l'un ou l'autre des effets secondaires graves suivants se manifeste : lymphopénie, qui est une réduction du nombre de certains globules blancs du sang, dont les symptômes sont des infections, une sensation de fatigue inhabituelle, de la fièvre, des courbatures, de la douleur et des symptômes faisant penser à ceux de la grippe; zona, dont les symptômes sont une douleur aiguë et une éruption cutanée avec des cloques sur une « bande » localisée, habituellement sur un seul côté du haut du corps ou du visage, des maux de tête, une sensation de brûlure, des picotements, un engourdissement ou une démangeaison de la peau dans la zone touchée ou une sensation de malaise généralisé ou de la fièvre dans les premiers stades de l'infection; problèmes de foie, dont les symptômes sont des nausées, des vomissements, des douleurs d'estomac, une perte d'appétit, de la fatigue, des urines foncées ou un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux; tuberculose, dont les symptômes sont une toux qui persiste, de la fièvre ou une perte de poids. Cessez de prendre MAVENCLAD et consultez immédiatement un médecin si vous avez une réaction allergique (hypersensibilité); les symptômes comprennent une éruption cutanée, de l'urticaire, des démangeaisons, de l'enflure, un essoufflement, de la fièvre, une respiration sifflante, un écoulement nasal, des démangeaisons aux yeux et un larmolement. Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire inconfortable qui n'est pas mentionné ici ou qui s'aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, consultez votre professionnel de la santé.

Autres mises en garde à connaître

Analyses sanguines

On vous fera passer des analyses sanguines avant que vous ne commenciez le traitement par MAVENCLAD, ainsi que pendant et après le traitement, afin de s'assurer que vous pouvez continuer à prendre MAVENCLAD et que vous ne développez aucune complication à cause du traitement.

Vaccination

Parlez à votre professionnel de la santé si vous avez récemment reçu ou si vous pourriez recevoir certains vaccins appelés vaccins « vivants » ou « vivants atténués ». Le traitement peut seulement commencer 6 semaines après la vaccination. Si nécessaire, vous serez vacciné contre la varicelle avant le début du traitement. Vous ne devez pas recevoir de vaccin pendant le traitement. Vous pouvez seulement vous faire vacciner après le traitement une fois que le nombre de vos globules blancs est normal.

Leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP)

La LEMP est un trouble rare du cerveau provoqué par une infection; il s'agit d'une affection grave pouvant entraîner une invalidité grave ou même la mort. Par précaution, il se peut qu'on vous fasse passer un examen d'IRM (imagerie par résonance magnétique) de la tête avant le début du traitement. Cela est particulièrement important si vous avez déjà pris d'autres médicaments contre la sclérose en plaques associés à un risque de LEMP. Parlez à votre professionnel de la santé si vous pensez que votre SP s'aggrave ou si vous constatez de nouveaux symptômes comme les suivants : faiblesse sur un côté du corps qui s'aggrave, maladresse avec vos bras ou vos jambes, trouble de la vision, changements affectant votre capacité de penser et votre mémoire qui entraînent une confusion et des changements dans votre personnalité.

Risque de cancer

MAVENCLAD pourrait potentiellement augmenter le risque de cancer. Suivez les instructions données par votre professionnel de la santé concernant le dépistage du cancer.

Intolérance au fructose

MAVENCLAD contient du sorbitol. Ne prenez pas MAVENCLAD si vous avez des problèmes héréditaires d'intolérance au fructose.

Grossesse et fertilité

Les femmes et les hommes doivent utiliser une méthode de contraception efficace durant le traitement et pendant au moins 6 mois après la dernière dose. Chez les femmes qui prennent MAVENCLAD, on ne sait pas si le médicament réduira l'efficacité de la pilule contraceptive. Par conséquent, il faut utiliser une méthode de contraception barrière (par exemple, des condoms) en plus de la pilule pendant le traitement et pendant au moins 4 semaines après la prise de la dernière dose pour chaque année de traitement. Si vous ou votre partenaire devenez enceinte pendant le traitement ou dans les 6 mois qui suivent la prise de la dernière dose, il peut y avoir un risque pour l'enfant à naître. Votre professionnel de la santé arrêtera le traitement par MAVENCLAD si vous êtes une femme et que vous devenez enceinte pendant le traitement. MAVENCLAD peut porter atteinte à la fertilité chez les hommes. Parlez à votre professionnel de la santé pour obtenir de plus amples renseignements. Comme on ne sait pas si MAVENCLAD est détectable dans le sperme, il convient d'utiliser une méthode de contraception barrière comme le condom pendant le traitement et dans les 10 jours qui suivent la prise de la dernière dose.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la notice d'accompagnement du médicament.

© 2022 EMD Serono. Tous droits réservés.
MAVENCLAD et adveva sont des marques déposées de Merck KGaA,
Darmstadt, Allemagne, ou de ses filiales.

Importateur et distributeur :
EMD Serono, une division d'EMD Inc., Canada
Une filiale de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne
2695 North Sheridan Way, bureau 200
Mississauga (Ontario) L5K 2N6 Canada
www.emdserono.ca

adveva : 1-877-777-3243

